



Roma, 08.09.2015

Ufficio: DIR/PF  
Protocollo: 201500005535/A.G.  
Oggetto: Ministero della Salute - Prevenzione e controllo dell'influenza:  
raccomandazioni per la stagione 2015-2016.

Circolare n. 9487

SS  
MED 40  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Ministero della Salute -prevenzione ed il controllo dell'influenza:  
raccomandazioni per la stagione 2015-2016*

Si trasmette la circolare annuale del Ministero della Salute per la prevenzione e il controllo dell'influenza stagionale.

Come di consueto il documento, oltre a fornire raccomandazioni per la prevenzione dell'influenza, offre anche un quadro dell'andamento epidemiologico della scorsa stagione.

Nella stagione 2014-2015, il picco epidemico è stato raggiunto nella quarta settimana del 2015 con un livello di incidenza pari a 10,9 casi per 1.000 assistiti. Il periodo epidemico (incidenza superiore a 2 casi per 1.000 assistiti) ha avuto una durata di 14 settimane. Sono stati segnalati 485 casi gravi e 160 decessi da influenza confermata da 19 regioni e province autonome; l'85% dei casi gravi è stato segnalato da 7 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia).

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**  
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093  
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

Nella maggior parte dei casi gravi segnalati quest'anno è stato isolato il virus A/H1N1pdm09 (76%), seguito dall'A/H3N2 (13%) e da virus A/non tipizzati (7%) e B (4%).

Molti casi si sono verificati in soggetti di età > 65 anni, con una età media di 60 anni (range 0-101), la più alta registrata dopo la stagione 2011/12 (63,5; range 0-88) dominata dal virus A(H3N2). Il 78% dei casi gravi ed il 91% dei decessi segnalati al sistema, nella stagione 2014/15, presentava almeno una patologia cronica preesistente per la quale la vaccinazione antinfluenzale viene raccomandata. Solo il 7,6% dei casi gravi segnalati al sistema era vaccinato.

L'offerta gratuita attiva della vaccinazione antinfluenzale è rivolta prioritariamente alle donne che si trovino nel 2° e 3° trimestre di gravidanza, a tutti i soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze, ai soggetti di età pari o superiore ai 65 anni, agli operatori sanitari che hanno contatto diretto con i pazienti e ad alti soggetti a rischio indicati nella tabella 1 allegata alla circolare ministeriale.

Il Ministero raccomanda inoltre un'attenta sorveglianza delle eventuali reazioni avverse sottolineando l'importanza della tempestiva segnalazione al sistema di farmacovigilanza dell'AIFA degli eventuali eventi avversi osservati in soggetti vaccinati.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO**  
(Dr Maurizio Pace)

**IL PRESIDENTE**  
(Sen. Andrea Mandelli)

All. 1